

**VIUSID®**  
**Polvo en sobres o jarabe**  
**(Ácido Glicirricínico, Glucosamina)**

**FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:****El Polvo contiene:**

Glucosamina.....	0,666 g
Ácido Glicirricínico.....	0,033 g
Vehículo, c.b.p. ....	4,000 g

**El jarabe contiene:**

Glucosamina.....	0,666 g
Ácido Glicirricínico.....	0,033 g
Vehículo, c.b.p. ....	500 ml

1

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** El Viusid® es un preparado nutricional y está indicado como terapia complementaria en pacientes que padezcan patologías que necesiten fortalecer el sistema inmune. Se usa en enfermedades virales graves como la hepatitis (A,B,C,D y combinadas) y en aquellos procesos anímicos que deprimen el sistema inmune como lo son la depresión y el stress.

**FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:** El Viusid® es un preparado nutricional compuesto por antioxidantes , vitaminas, oligoelementos y un componente que se extrae de la raíz del regaliz (ácido Glicirricínico) con propiedades antivirales. Esta especialmente diseñado para el aumento de las defensas inmunológicas. Ideal por tanto en aquellos procesos que causan inmunodeficiencia. El aporte de nutrientes con carácter antioxidante es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. VIUSID® constituye, por tanto, en este sentido una garantía.

La activación de los componentes de VIUSID® incrementan en gran medida el poder de las funciones biológicas de ellos, como lo son el poder antiviral y antioxidante, sin modificación o cambio en la estructura molecular y garantizando un aumento muy significativo de las defensas.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

**RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:** Ninguna, ya que hasta el momento no se han presentado.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** Los efectos secundarios del VIUSID® son suaves y transitorios, algunas veces resueltos en la segunda semana de administración. Ellos incluyen malestar abdominal (problemas con la intolerancia a la lactosa)

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:** No se ha reportado ninguna interacción medicamentosa ni de otro tipo.

**ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:** No se conocen a la fecha

**PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:** En los estudios realizados no se ha reportado nada al respecto.

**PRECAUCIONES:** No se deje al alcance de los niños

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

**Sobres:** La dosis recomendada en adultos es de tres sobres diarios, uno después de cada una de las principales comidas.

Niños mayores de 6 años: 1 sobre cada 12 horas después de las comidas

Niños menores de 6 años: ½ sobre cada 12 horas después de las comidas

**Jarabe:** La dosis recomendada es de 25 ml dos veces al día después de las comidas principales

**MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA**

**ACCIDENTAL:** La sobredosificación con VIUSID® es poco probable ya que la toxicidad es nula.

**PRESENTACIONES:**

Viusid® es presentado en cajas de 21 y 90 sobres de 4 grs. o en jarabe de 100 y 500 ml.

**RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:** Viusid® debe ser almacenado en lugares fríos y secos.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:**

Literatura exclusiva para médicos. No sé al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica

Hecho en España  
Catalysis, SL  
Macarena 14  
Madrid, España

Importado y Distribuido por:  
Dermaceutical México, S.A. de C.V.  
Quemada 240, Col. Narvarte Poniente  
Deleg. Benito Juárez, C.P. 03020  
México, D.F.